

МАТРОИДЫ И ГРАФЫ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ

Литература

1. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы. – СПб.: Лань, 2010. – 368 С.
2. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории графов. – М.: Наука, 1990.
3. Уилсон Р. Введение в теорию графов. – М.: Мир, 1977.
4. Айгнер М. Комбинаторная теория. – М.: Мир, 1982.

Пусть V — непустое конечное множество.


Обыкновенным графом G называется пара множеств (V, E) , где E — произвольное множество двухэлементных подмножеств из V .

Элементы множеств V и E называют соответственно **вершинами** и **ребрами** графа G . Множества вершин и ребер графа G будем обозначать также через V_G и E_G .

Если $n = |V|$ и $m = |E|$, то G называют (n, m) -**графом**.

Обыкновенные графы удобно представлять в виде **диаграмм**, на которых вершинам соответствуют выделенные точки, а ребрам — непрерывные кривые, соединяющие эти точки.


На рис. изображены диаграммы трех обыкновенных графов.



Мы будем рассматривать также объекты более общего вида, чем обыкновенные графы.

Такие объекты в дальнейшем будут называться *графами*.

На рис. изображен граф, в котором существуют пары вершин, соединенные более чем одним ребром.



Различные ребра, соединяющие две данные вершины, называются *кратными*.

Граф, изображенный на рис., содержит ребра, соединяющие вершину саму с собой. Такие ребра называют *петлями*.

Более точно, *графом* называют тройку (V, E, φ) , где V, E — конечные множества, $V \neq \emptyset$ и φ — отображение из E в множество не более чем двухэлементных непустых подмножеств из V .

Если $\varphi(e) = \{u, v\}$, где $u \neq v$, то говорят, что ребро e *соединяет вершины u, v* . В этом случае будем писать $e = uv$.

Если $\varphi(e) = \{u\}$, то ребро e называют *петлей* в вершине u . В этом случае будем также писать $e = uu$ и говорить, что e *соединяет вершину u саму с собой*.

Мы часто будем опускать φ и представлять граф в виде $G = (V, E)$.

Граф есть набор из двух множеств произвольной природы — непустого множества вершин и множества ребер, причем каждому ребру соответствуют две концевые вершины, которые, вообще говоря, могут и совпадать (в этом случае ребро является петлей).

Отметим, что *обыкновенный граф* — это граф без петель и кратных ребер.

Граф G , имеющий n вершин, часто называют *n -графом*; если, кроме того, G содержит m ребер, то G — *(n, m) -граф*.


Если $e = uv$ — некоторое ребро данного графа, то вершины u , v называются *смежными*; говорят также, что u , v — *концевые вершины* ребра e .

Ребро e и вершина v *инцидентны*, если v — концевая вершина для e .

Ребра e и f называются *смежными*, если они имеют общую концевую вершину.

Пусть $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ — два графа.

Биективное отображение $\psi : V_1 \rightarrow V_2$ называется **изоморфизмом** G_1 на G_2 , если для любых $u, v \in V_1$ число ребер, соединяющих вершины u и v в G_1 , равно числу ребер, соединяющих $\psi(u)$ и $\psi(v)$ в G_2 (разумеется, при $u = v$ число петель в вершине u равно числу петель в вершине $\psi(u)$).




Пример. Школьный класс, учитель и школьники.

Вершины графа – люди в классе,

Ребра графа – парты, за которыми сидят школьники. За каждой партой сидит кто-либо и за каждой партой сидит не более двух школьников.

Возможная диаграмма такого графа:



Отношение «*быть изоморфными*» на совокупности всех графов является отношением эквивалентности. Совокупность всех графов разбивается на классы попарно изоморфных графов. Заметим, что диаграмма задает граф с точностью до изоморфизма.

Степенью вершины v называется число ребер, инцидентных этой вершине, причем каждая петля учитывается дважды.

Степень вершины v обозначается через $\deg G (v)$ или просто через $\deg v$. Ясно, что в обыкновенном графе степень вершины v равна количеству вершин, смежных с v .

Окружением $N(v)$ вершины v называется множество всех вершин, смежных с v .

Если $\deg v = 0$, то вершина v называется **изолированной**, а если $\deg v = 1$, то — **висячей**.

Ребро e , инцидентное висячей вершине, также называют **висячим**.

Лемма 1 (о рукопожатиях). Пусть G — произвольный граф. Тогда

$$\sum_{v \in VG} \deg v = 2|EG|.$$

Доказательство. При подсчете суммы степеней произвольное ребро $e = uw$ внесет свой вклад, равный единице, как в $\deg u$, так и в $\deg w$, причем петля будет учитываться дважды.

Следствие. Произвольный граф содержит четное число вершин нечетной степени.

Доказательство. Пусть V_0 и V_1 — соответственно множества вершин четной и нечетной степени. Тогда

$$\sum_{v \in V_0} \deg v + \sum_{v \in V_1} \deg v = 2|EG|.$$

Ясно, что первое слагаемое четно. Поэтому второе слагаемое также четно. Так как во второй сумме все слагаемые нечетны, их число четно. Следовательно, множество V_1 содержит четное число вершин и **следствие доказано.**

Граф G называется *нулевым* или *вполне несвязным*, если множество его ребер EG пусто.

Нулевой n -граф будем обозначать через O_n .

Диаграмма графа O_4 приведена на рис. 1.

Ясно, что нулевой граф является обыкновенным графом.

Обыкновенный граф G называется *полным графом*, если любые его две различные вершины смежны.

Для полного n -графа применяется обозначение K_n .

На рис. 1 приведена также и диаграмма графа K_4 .

Степень каждой вершины в графе K_n равна $n - 1$, а число ребер в K_n равно $n(n - 1) / 2$.

Граф G называют *двудольным*, если множество VG можно разбить на два непустых подмножества X и Y так, что любое ребро графа соединяет вершину из X с вершиной из Y . Множества X и Y — это доли двудольного графа G .

Если любые вершины $x \in X$ и $y \in Y$ смежны и двудольный граф является обыкновенным графом, то G называют *полным двудольным графом*.

Если $|X| = p$, $|Y| = q$, то такой полный двудольный граф обозначают через $K_{p,q}$.

Граф H называется *подграфом* графа G , если $VH \subseteq VG$ и $EH \subseteq EG$.

В число подграфов графа G будем включать и пустой подграф \emptyset .

Если $VH = VG$, то подграф H называется *остовным подграфом*.

Пусть U — подмножество из VG . Обозначим через D множество всех ребер $e = uv \in EG$ таких, что $u, v \in U$. Граф $G(U) = (U, D)$ называется *подграфом, порожденным множеством вершин U* .

Аналогично определяется подграф, порожденный заданным множеством ребер. Пусть $D \subseteq EG$. Обозначим через U множество всех вершин, являющихся концевыми для ребер из D . Граф $G(D) = (U, D)$ называют *подграфом, порожденным множеством ребер D* .

Пусть G — произвольный граф и H — его подграф.

С каждой вершиной v и каждым ребром e можно связать подграфы
 $H - v$, $H - e$ и $H + e$.

Подграф $H - v$ получается из подграфа H удалением вершины v и всех инцидентных этой вершине ребер. Отметим, что если v не лежит в подграфе H , то $H - v = H$.

Подграф $H - e$ получается из H удалением ребра e . Здесь также $H - e = H$, если e не лежит в H .

Подграф $H + e$ получается из H добавлением ребра e и двух его концевых вершин.

Через $\text{Sub}(G)$ будем обозначать множество всех подграфов графа G .

Определим отношение \leq на $\text{Sub}(G)$, полагая $H_1 \leq H_2$ для подграфов H_1 и H_2 графа G iff, когда H_1 является подграфом в H_2 , т. е. когда $VH_1 \subseteq VH_2$ и $EH_1 \subseteq EH_2$.

Отношение \leq является частичным порядком на $\text{Sub}(G)$. Будем говорить, что H_1 содержится в H_2 , если $H_1 \leq H_2$.

Пусть H_1 и H_2 — произвольные подграфы графа G .

Определим объединение $H_1 \cup H_2$ подграфов H_1 и H_2 , полагая

$$V(H_1 \cup H_2) = VH_1 \cup VH_2 \quad \text{и} \quad E(H_1 \cup H_2) = EH_1 \cup EH_2.$$

$H_1 \cup H_2$ является точной верхней границей для H_1 и H_2 в $\text{Sub}(G)$ относительно \leq .

Определим пересечение $H_1 \cap H_2$ подграфов H_1 и H_2 , полагая

$$V(H_1 \cap H_2) = VH_1 \cap VH_2 \quad \text{и} \quad E(H_1 \cap H_2) = EH_1 \cap EH_2.$$

$H_1 \cap H_2$ является точной нижней границей для H_1 и H_2 в $\text{Sub}(G)$ относительно \leq .

Нетрудно установить, что $\text{Sub}(G)$ является дистрибутивной решеткой относительно \leq с указанными операциями \cup и \cap .

Пусть H_1, H_2, \dots, H_t — подграфы графа G , которые попарно не пересекаются.

$H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_t$ называется дизъюнктивным объединением и обозначается через

$$H_1 \uplus H_2 \uplus \dots \uplus H_t.$$